



FICHE SANTÉ / BRONCHIOLITE



SYMPTÔMES

- Toux creuse ;
- Écoulement nasal ;
- Fièvre légère ;
- Respiration sifflante ;
- Agitation ;
- Tirage de la paroi thoracique et des battements des ailes du nez.

MODE DE TRANSMISSION

La transmission se fait par gouttelettes, par contact direct et par contact indirect.

PRÉVENTION ET MESURES DE CONTRÔLE

Il est important de resserrer les mesures d'hygiène, en insistant sur le lavage des mains et la désinfection des surfaces de jeux et des jouets. Aussi, il est nécessaire de couvrir sa bouche avec le pli du coude en cas de toux et de se couvrir le nez avec un mouchoir en cas d'éternuement.

La bronchiolite ne nécessite pas nécessairement l'exclusion de l'enfant de son lieu de garde ou de son école. Toutefois, il est préférable de garder l'enfant à la maison pendant la période de fièvre. Le retour au CPE peut se faire une fois que l'état de santé de l'enfant lui permet de participer aux activités du groupe.

RETRAIT DE LA GARDERIE ?

Non

Oui

Durée du retrait :



HEALTH SHEET / BRONCHIOLITIS



SYMPTOMS

- Dry cough ;
- Runny nose ;
- Mild fever ;
- Wheezing ;
- Restlessness ;
- Chest wall retractions and flaring of the nostrils.

TRANSMISSION

Transmission occurs through droplets, direct contact, and indirect contact.

PREVENTION AND CONTROL MESURES

It is important to tighten hygiene measures, emphasizing handwashing and the disinfection of play surfaces and toys. Additionally, it's necessary to cover one's mouth with the crook of the elbow when coughing and to cover the nose with a tissue when sneezing.

Bronchiolitis does not necessarily require the exclusion of the child from their daycare or school. However, it is preferable to keep the child at home during the fever period. The return to daycare can occur once the child's health allows them to participate in group activities.

REMOVAL FROM DAYCARE ?

No

Yes

Duration of removal :