



## FICHE SANTÉ / ROUGEOLE



### SYMPTÔMES

- Fièvre;
- Toux ;
- Congestion nasale et d'écoulement nasal ;
- Conjonctivite (yeux rouges qui coulent et sensibles à la lumière) ;
- Rougeurs qui apparaissent au visage et sur le corps.

### MODE DE TRANSMISSION

La transmission se fait par gouttelettes, par contact direct et par contact indirect.

### PRÉVENTION ET MESURES DE CONTRÔLE

Il est important de resserrer les mesures d'hygiène, en insistant sur le lavage des mains et la désinfection des surfaces de jeux et des jouets. Aussi, il est nécessaire de couvrir sa bouche avec le pli du coude en cas de toux et de se couvrir le nez avec un mouchoir en cas d'éternuement.

La rougeole nécessite l'exclusion de l'enfant de son lieu de garde ou de son école en cas de fièvre, ou jusqu'au 4ème jour après l'apparition des éruptions cutanées. Le retour au CPE peut se faire une fois que l'état de santé de l'enfant lui permet de participer aux activités du groupe.

### RETRAIT DE LA GARDERIE ?

**Non**

**Oui**

Durée du retrait :



## HEALTH SHEET / MEASLES



### SYMPTOMS

- Fever ;
- Cough ;
- Nasal congestion and runny nose ;
- Conjunctivitis (red, watery eyes sensitive to light) ;
- Redness appearing on the face and body.

### TRANSMISSION

Transmission occurs through droplets, direct contact, and indirect contact.

### PREVENTION AND CONTROL MEASURES

It is important to tighten hygiene measures, emphasizing handwashing and the disinfection of play surfaces and toys. Additionally, it's necessary to cover one's mouth with the crook of the elbow when coughing and to cover the nose with a tissue when sneezing.

Measles requires the exclusion of the child from their daycare or school in case of fever, or until the 4th day after the onset of the rash. The return to daycare can occur once the child's health allows them to participate in group activities.

### REMOVAL FROM DAYCARE ?

**No**

**Yes**

Duration of removal :